



COLEÇÃO DE AMENDEIRAS DO ALGARVE
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE VARIEDADES

João Costa
Armindo Rosa

DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE

COLECÇÃO DE AMENDOEIRAS DO ALGARVE
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE VARIEDADES

João Costa
Armindo Rosa

DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE

FARO 2020



ÍNDICE

I – Introdução	5
II – Origem, Classificação Botânica e Principais	
Características Morfológicas	6
III – Material e Métodos - Instalação da Colecção do CEAT.....	7
IV – Caracterização Morfológica	7
V – Fichas de caracterização das distintas variedades	9

AMENDOEIRAS:

Duro da Estrada	10	Gama	32
Coco	11	Rogel	33
Galamba de Boliqueime	12	Bonita de S. Brás	34
Cacela / Manta Rota	13	Molarinha	35
Quinta de Valim	14	Quinta de Flandes	36
Rabo de Zorra	15	Ferragnês	37
Boa Casta	16	Guara	38
Bonita	17	Texas	39
Do Prato / Bico de Papagaio	18	Moncaio	40
Zé Salles	19	Genco	41
Galamba	20	Miagos Kosculene	42
Zé de Oliveira	21	Marcona	43
Ferragudo	22	Cristo Morto	44
Molar Salles	23	Desmayo	45
Molar Passarinho	24	Non Pareil	46
Molar da Fuseta	25	Manuel Bento	47
Gama Dura	26	Passarinho	48
Aleluia	27	Molar Tenra	49
Lourencinha	28	Coco Grado	50
Norinha	29	Duro Amarelo	51
Lourencinha de Messines	30	Coco Antigo	52
Paderne	31	Asseria	53

Zé Dias Miúdo	54	Saya Longa	86
Castanho	55	Romeira	87
Duro da Estrada Grado	56	Ribeton	88
Carrusca	57	Glorieta	89
Mendes	58	Jefferies	90
Molar Alcaria	59	Marcelina Grada	91
Duro Amarelo Grado	60	Carmel	92
Sousa	61	Masbovera	93
Canhota	62	Pegarinhos	94
Bonita de Semente	63	Francoli	95
Carrapata	64	Laurane	96
Chatinhas	65	Dona Virtude	97
Bonita do Calço	66	Mourisca	98
Galamba Grado	67	Padre	99
Chorão	68	Casa Nova	100
Barrinho Grado	69	Fura Sacos	101
Calhandrina	70	Price	102
Parida	71	Monterrei	103
Verdeal	72	Colossal	104
Zé Dias	73	José Dias	105
Cerro do Gato	74	Duro da Estrada	106
Duro Italiano	75	Gama	107
Amarelo Bonito	76	Bonita	108
Patarata	77	Desmayo	109
Viegas	78	Ferragnês	110
Laja	79	Ferraduel	111
Verniz	80	Ferrastar.....	112
Manuel de Oliveira	81	Cristo Morto	113
João Dias	82		
Enxame	83	ANEXO I:	
Do Convento	84	Floração da Coleção de Amendoeiras	
Ferralise	85	do CEAT (Média de 2016 / 2018)	114

I – INTRODUÇÃO

Espécie rústica, de climas quentes e temperados, pouco exigente em solos, encontra no Algarve condições edafo-climáticas extremamente favoráveis ao seu desenvolvimento. Sobre ela se contam lendas de príncipes e princesas aquando da passagem dos árabes pela região, simbolizando a sua alva floração a brancura das distantes e saudosas neves das montanhas do Atlas. Componente do histórico e tradicional pomar de sequeiro, outrora com grande peso e importância sócio-económica na região, tem vindo a perder importância com abandono generalizado, devido aos baixos preços praticados, fraca produtividade e pouco rendimento, se bem que nos últimos anos se venha notando um novo e real interesse pela cultura não só no Algarve e Trás os Montes como principalmente na região do Alentejo.

Não é por demais recordar, ter sido função da qualidade nomeadamente dos elevados teores de açúcar e gordura que a amêndoa do Algarve foi considerada no mercado internacional como sendo uma das melhores do mundo.

A tradição da cultura levou à existência de uma grande diversidade de variedades com interesse quer para doçaria quer para torrefacção e consumo como aperitivo. No ano de 1987 foi implementada no Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT) uma colecção de amendoeiras englobando cerca de 50 variedades transferidas de uma antiga colecção existente no Morgado da Lameira em Alcantarilha. O projecto FRUTALG (Prospecção, Recolha e Caracterização de Variedades Tradicionais de Fruteiras Algarvias com Interesse para a Agricultura Portuguesa) que decorreu entre 2011 e 2014 através de uma pesquisa, georeferênciação e recolha por toda a região, permitiu a instalação de uma nova colecção de elevado valor cultural e genético, a qual totaliza no momento mais de 100 variedades devidamente cuidadas e preservadas, a maioria tradicionais da região, algumas estrangeiras com representatividade e importância em diversos países. Pouca informação escrita existe sobre todo este património.

Caracterizar e conhecer melhor não só as variedades tradicionais de amendoeiras do Algarve como também as restantes, é trabalho que integrado nos nossos objectivos, temos vindo a desenvolver nos últimos três anos. Esperemos que o mesmo possa vir a contribuir quer para ajuda na tomada de decisão por parte dos nossos agricultores na escolha das variedades mais interessantes, como também para o desenvolvimento da fruticultura nacional.

II – ORIGEM, CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

A amendoeira pertence à família *Rosaceae*, género *Prunus*, espécie *Prunus amygdalus* *Basch*. Originária das zonas áridas da Ásia Central segundo uns autores, do Norte de África segundo outros, foi trazida pelos romanos e árabes para Portugal, encontrando na região mediterrânica condições adequadas ao seu bom desenvolvimento. Distribui-se na actualidade por todas as regiões temperadas de clima benigno sem riscos de ocorrência de geadas à altura da floração. Adapta-se a uma grande gama de solos preferindo os arenosos, francos, suportando mesmo os bastante calcários. Não tolera os pesados, encharcados, com drenagem deficiente onde morre por asfixia radicular.

A produção mundial encontra-se maioritariamente nos Estados Unidos nomeadamente na Califórnia com mais de 80% da produção, seguindo-se a larga distância a produção na região Mediterrânica, Chile e Austrália.

Trata-se de uma espécie com grande diversidade de variedades, denominações varietais ou sinónimas. Em função da dureza da casca as variedades de amendoeiras podem classificar-se nos seguintes grupos:

- *Prunus amygdalus* var. óssea ou durazea – Amêndoa de casca dura;
- *Prunus amygdalus* var. fragilis – Amêndoa molar;
- *Prunus amygdalus* var. fragilina – Amêndoa coca.

Em função do sabor do miolo além das variedades produtoras de frutos com miolo doce (*Prunus amygdalus*) existem ainda as variedades amargas (*Prunus amygdalus* var. amara).

As flores de cor branca ou rosada são constituídas por cinco pétalas e cinco sépalas. Trata-se de uma espécie autoestéril ou autoincompatível necessitando de polinização cruzada se bem que na actualidade já existem no mercado variedades autocompatíveis ou autoférteis dispensando polinização. Frutifica essencialmente em ramos mistos, verdascas ou ramalhetes de maio. O fruto é uma drupa de casca mais ou menos dura no interior da qual se desenvolve o miolo ou semente.

III – MATERIAL E MÉTODOS - INSTALAÇÃO DA COLECÇÃO DO CEAT

- Prospeccção e georeferênciação por toda a região, de barlavento a sotavento, no litoral, barrocal e serra, de variedades ou denominações varietais de amendoeiras algarvias;
- Preparação do terreno para a plantação (ripagem, lavoura, gradagem);
- Análises de solo e realização da fertilização de fundo em função dos resultados das análises;
- Instalação do sistema de rega gota a gota;
- Plantação no CEAT de Tavira do porta enxerto GF667 segundo o compasso de 6 m nas entre linhas por 4 m na linha;
- Colocação de tutores após a plantação para sujeição das plantas;
- Colheita de varetas com borbulhas nas variedades previamente marcadas tendo em vista a realização das enxertias no campo;
- Realização das enxertias de borbulha durante o período de Primavera;
- Formação e condução em vaso;
- Realização de todos os trabalhos e amanhos culturais nomeadamente podas, limpeza de rebentos, controle de infestantes, rega, fertilização de cobertura e tratamentos adequados.

IV – CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA


Dado o grande número de variedades que compõem a colecção e a falta de meios técnicos disponíveis, a caracterização foi feita tendo como base descritores simplificados da UPOV com incidência num conjunto de parâmetros considerados importantes para a produção tais como:

- Planta – Porte, Vigor, Densidade de Folhagem e Rebentação Foliar;
- Folha – Tamanho e Cor do Folíolo;
- Flor – Distribuição, Tamanho, Cor das Pétalas, Início de Floração;
- Fruto – Tamanho, Forma, Resistência ao Partir, Peso Médio, Rendimento Casca/Miolo, Produtividade;

V – FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DAS DISTINTAS VARIEDADES

AMENDOEIRAS

**Observações das características das plantas e frutos
(2016/2018)**



Duro da Estrada

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5/7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.6
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.4
	Rendimento em miolo % –	23.4

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte aberto, média a forte densidade foliar, com floração precoce a semi precoce, branca a branco rosada. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho escuro. Produção e rendimento em miolo médios.



Coco

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio (g) –	3.3
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	46

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte erecto, aberto, forte a média densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio, oval arredondado a elíptico, de casca muito frágil. Miolo médio a grande, elíptico alargado, castanho escuro. Produção fraca, rendimento em miolo elevado.



Galamba de Boliqueime

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	3
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Peso médio (g) –	5.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	21.2

Apreciação geral: Variedade de fraco vigor, porte erecto, média densidade foliar, com floração precoce, branca a branco rosada. Fruto pequeno a médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Pouco produtiva, rendimento em miolo baixo.



Cacela / Manta Rota

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5/7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3/5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio (g) –	4.7
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	29.7

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração precoce decor rosa escuro. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produtiva, com bom rendimento em miolo.



Quinta de Valim

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhotes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3/5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Peso médio (g) –	4.6
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	25.2

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce, branco rosada a rosa escuro. Fruto pequeno a médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Rabo de Zorra

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5/7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3/5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.1
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	23.4

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte aberto, fraca a média densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Boa Casta

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Flor	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
Fruto	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio (g) –	4.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	27.7

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração precoce branco rosada. Fruto médio, pontiagudo, de casca dura. Miolo médio, elíptico, castanho claro. Produtiva, com médio rendimento em miolo.



Bonita

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5/7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.0
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	25.1

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, aberto, forte densidade foliar, com floração branca, semi precoce. Fruto médio, elíptico, de casca dura. Miolo médio, eleíptico, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.

Do Prato / Bico de Papagaio

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3/5
	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor da pétala – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio (g) –	
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio do miolo (g) –	
	Rendimento em miolo % –	

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração precoce a semi precoce branco rosada. Sem produção, fruto por caracterizar.

Zé Salles

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	3
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3/5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio (g) –	
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio do miolo (g) –	
	Rendimento em miolo % –	

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, média a forte densidade foliar, com floração precoce a semi precoce branco rosado. Sem produção, fruto por caracterizar.



Galamba

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhotes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.6
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	22.5

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, média densidade foliar, floração semi precoce, branca a branco rosada. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Zé de Oliveira

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3/5
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio (g) –	3.9
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.4
	Rendimento em miolo % –	36.1

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto , caído, com floração semi precoce branco rosada. Fruto pequeno a médio, elíptico, de casca semi dura a dura. Miolo médio, elíptico, castanho claro. Produtiva, com elevado rendimento em miolo.



Ferragudo

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3/5
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Flor	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Fruto	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Peso médio (g) –	4.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	28.1

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte aberto, caído, forte densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio, pontagudo, de casca dura. Miolo médio, elíptico, castanho claro. Produtiva, com médio rendimento em miolo.



Molar Salles

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio (g) –	3.0
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	42.6

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio, pontiagudo, de casca frágil, molar. Miolo médio, elíptico, castanho claro. Produtividade média, rendimento em miolo elevado.



Molar Passarinho

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3/5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Peso médio (g) –	3.5
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	3/5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	1/3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.6
	Rendimento em miolo % –	46.0

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração precoce, branco a branco rosada. Fruto médio, elíptico a pontagudo, de casca frágil, molar. Miolo grande, estreito a elíptico, amarelo a castanho claro. Produção baixa, elevado rendimento em miolo.



Molar da Fuseta

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio (g) –	5.0
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5/7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.6
	Rendimento em miolo % –	30.3

Apreciação geral: Variedade de vigor médio, porte aberto, forte densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio, pontiagudo, de casca semi dura a dura. Miolo grande, elíptico a elíptico alargado, castanho claro. Produção média, rendimento em miolo elevado.



Gama Dura

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Flor	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	7.4
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Peso médio do miolo (g) –	1.7	
	Rendimento em miolo % –	22.9

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, caído, fraca a média densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo grande, elíptico alargado, castanho claro. Produtiva, médio rendimento em miolo.



Aleluia

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3/5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio (g) –	4.8
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	30.3

Apreciação geral: Variedade de vigor médio, porte aberto, forte densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio, elíptico, pontiagudo, de casca dura. Miolo médio a grande, elíptico alargado, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médio a elevado.



Lourecinha

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1/3
Fruto	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.8
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.7
	Rendimento em miolo % –	27.5

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio, oval arredondado a elíptico, de casca dura. Miolo grande, elíptico alargado, castanho claro. Produtiva, médio rendimento em miolo.



Norinha

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	3
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	4.8
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	26.6

Apreciação geral: Variedade de fraco vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio, elíptico, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Fraca produção, médio rendimento em miolo.



Lourencinha de Messines

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3/5
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
Fruto	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	4.0
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
Peso médio do miolo (g) –	1.0	
	Rendimento em miolo % –	27.8

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, caído, média densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto pequeno a médio, oval arredondado a elíptico, de casca dura. Miolo pequeno, elíptico alargado, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Paderne

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	4.1
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.1
	Rendimento em miolo % –	26.0

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto pequeno a médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo pequeno a médio, elíptico alargado, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Gama

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Flor	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5/7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	3/5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	4.8
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5/7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	1/3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	29.0

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce a tardia de cor branca. Fruto médio, elíptico a arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico a elíptico alargado, amarelo a castanho claro. Fraca produção, médio rendimento em miolo.



Rogel

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	4.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.1
	Rendimento em miolo % –	25.1

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce, branca a branco rosada. Fruto pequeno a médio, oval arredondado a elíptico, de casca dura. Miolo pequeno, elíptico, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Bonita de S. Brás

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio (g) –	3.6
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	3/5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Peso médio do miolo (g) –	1.2	
	Rendimento em miolo % –	31.5

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce, branca a branco rosada. Fruto médio, pontagudo, de casca semi dura. Miolo médio, elíptico estreito a elíptico, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Molarinha

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio (g) –	2.3
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	52.0

Apreciação geral: Variedade vigorosa, porte aberto, forte densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto pequeno, oval arredondado, de casca frágil, molar. Miolo pequeno a médio, elíptico alargado, castanho claro. Pouco produtiva, alto rendimento em miolo.



Quinta de Flandes

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
Fruto	Peso médio (g) –	4.7
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5/7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.7
	Rendimento em miolo % –	35.8

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, fraca a média densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio, elíptico, de casca dura a semi dura. Miolo médio a grande, elíptico a elíptico alargado, castanho claro. Produção média, rendimento em miolo levado.



Ferragnês

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5/7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3/5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio (g) –	6.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	27.0

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte aberto, caído, média densidade foliar, com floração semi precoce a tardia, branca. Fruto médio a grande, elíptico a pontagudo, de casca semi dura a dura. Miolo médio a grande, elíptico, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Guara

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5/7
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5/7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Peso médio (g) –	4.3
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	33.9

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, fraca a média densidade foliar, com floração semi precoce a tardia, branca. Fruto médio a grande, elíptico, de casca dura a semi dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produção média, rendimento em miolo elevado.



Texas

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3/5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio (g) –	3.3
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.7
	Rendimento em miolo % –	51.3

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração tardia branco rosada. Fruto médio, elíptico a pontagudo, de casca frágil. Miolo médio a grande, elíptico, castanho claro. Baixa a média produção, elevado rendimento em miolo.



Moncaio

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Peso médio (g) –	4.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.0
	Rendimento em miolo % –	20.0

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração tardia, branca a branco rosada. Fruto pequeno a médio, elíptico, de casca dura. Miolo pequeno, elíptico, castanho claro. Produção e rendimento em miolo baixos.



Genco

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5/7
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio (g) –	5.0
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	30.9

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração tardia de cor branca. Fruto médio, elíptico, de casca dura a semi dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Podutiva, bom rendimento em miolo.



Miagos Kosculene

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Peso médio (g) –	2.7
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	3/5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio do miolo (g) –	1.8
	Rendimento em miolo % –	56.0

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração tardia de cor rosa escuro. Fruto médio, pontiagudo, de casca muito frágil. Miolo grande, estreito a elíptico, castanho escuro. Produção baixa, rendimento em miolo elevado.



Marcona

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio (g) –	5.7
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	26.5

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce rosa escuro. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura a semi dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produtiva, médio rendimento em miolo.



Cristo Morto

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Flor	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
	Distribuição – Esporões/Ramalhotes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5/7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio (g) –	6.0
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Fruto	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	1/3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.7
	Rendimento em miolo % –	27.9

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, aberto, média a forte densidade foliar, com floração semi precoce a tardia, branca a branco rosada. Fruto médio a grande, pontiagudo, de casca dura a semi dura. Miolo grande, elíptico alargado, amarelo a castanho claro. Produtiva, rendimento em miolo médio.



Desmayo

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	28.2

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte erecto, aberto, forte densidade foliar, com floração precoce branco rosada. Fruto médio a grande, pontagudo, de casca dura. Miolo médio a grande, elíptico, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.

Non Pareil

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	3/5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétala – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio (g) –	
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio do miolo (g) –	
	Rendimento em miolo % –	

Apreciação geral: Variedade de fraco a médio vigor, porte aberto, fraca a média densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Sem produção, fruto por caracterizar.



Manuel Bento

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5/7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	3.5
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.1
	Rendimento em miolo % –	29.4

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração precoce, branca a branco rosado. Fruto pequeno, oval arredondado, de casca dura. Miolo pequeno, elíptico alargado, castanho claro. Produção baixa, rendimento em miolo médio.

Passarinho

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3
	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétala – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio (g) –	
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio do miolo (g) –	
	Rendimento em miolo % –	

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração precoce de cor branca. Sem produção, fruto por caracterizar.



Molar Tenra

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio (g) –	5.5
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3/5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	26.7

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, forte densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura a semi dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro a castanho escuro. Produção baixa, rendimento em miolo médio.



Coco Grado

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhotes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaguda 5	3/5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Peso médio (g) –	3.4
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	38.2

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração precoce branco rosada. Fruto médio a grande, elíptico a pontiagudo, de casca muito frágil. Miolo médio agrande, elíptico, castanho claro. Baixa produção, elevado rendimento em miolo.



Duro Amarelo

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.5
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	3
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	1/3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	21.2

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Fruto médio a grande, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico, amarelo a castanho claro. Produção média, rendimento em miolo baixo.



Coco Antigo

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	3/5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	3
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
Fruto	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio (g) –	2.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Peso médio do miolo (g) –	1.3	
	Rendimento em miolo % –	48.0

Apreciação geral: Variedade de fraco a médio vigor, porte aberto, fraca densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto pequeno a médio, oval arredondado a elíptico, de casca muito frágil. Miolo médio, elíptico alargado, castanho escuro. Baixa produção, rendimento em miolo muito elevado.

Asseria

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio (g) –	
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio do miolo (g) –	
	Rendimento em miolo % –	

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte aberto, fraca densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Sem produção, fruto por carcterizar.



Zé Dias Miúdo

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Flor	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3/5
	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
Fruto	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	4.8
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	1/3	
Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5	
Peso médio do miolo (g) –	1.2	
Rendimento em miolo % –	21.6	

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração precoce branco rosada. Fruto médio, oval arredondado a elíptico, de casca dura. Miolo médio, elíptico, amarelo a castanho claro. Produção média, rendimento em miolo baixo.



Castanho

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3/5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	24.8

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração precoce de cor branca. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico, castanho claro a castanho escuro. Produção e rendimento em miolo médios.



Duro da Estrada Grado

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
Fruto	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	6.1
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	23.2

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração precoce branco rosada. Fruto médio a grande, oval arredondado a elíptico, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho escuro. Produtiva, rendimento em miolo médio.



Carrusca

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3/5
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.1
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.1
	Rendimento em miolo % –	20.4

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, caído, média densidade de folhagem, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio, elíptico, de casca dura. Miolo médio, elíptico, castanho claro. Produção média, baixo rendimento em miolo.



Mendes

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Peso médio (g) –	3.6
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	0.9
	Rendimento em miolo % –	23.7

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração precoce a semi precoce, branca a branco rosada. Fruto pequeno, oval arredondado, de casca dura. Miolo pequeno, elíptico alargado, castanho claro. Produção baixa, rendimento em miolo média.



Molar Alcária

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio (g) –	2.3
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.0
	Rendimento em miolo % –	41.7

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, média densidade foliar, semi precoce, com floração branco rosada. Fruto pequeno, oval arredondado, de casca frágil. Miolo pequeno a médio, elíptico alargado, castanho claro. Produção média, elevado rendimento em miolo.



Duro Amarelo Grado

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Peso médio (g) –	4.8
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5/7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.4
	Rendimento em miolo % –	28.1

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, média densidade foliar, semi precoce, com floração branco rosada. Fruto pequeno, oval arredondado, de casca frágil. Miolo pequeno a médio, elíptico alargado, castanho claro. Produtiva, rendimento em miolo médio.



Sousa

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3/5
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	4.8
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	3/5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio do miolo (g) –	1.1
	Rendimento em miolo % –	21.5

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, caído, média densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Fruto médio, pontagudo, de casca rija. Miolo médio, estreito a elíptico, castanho claro. Produção e rendimento em miolo baixos.



Canhota

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhotes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Peso médio (g) –	5.1
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	24.1

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, média a forte densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produtiva, médio rendimento em miolo.



Bonita de Semente

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	4.3
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	0.9
	Rendimento em miolo % –	20.0

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte erecto, média densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Fruto pequeno, elíptico, de casca dura. Miolo pequeno, elíptico, castanho claro. Produção e rendimento em miolo baixos.



Carrapata

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
Fruto	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	7.5
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3	
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	20.2

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração precoce a semi precoce branco rosada. Fruto médio a grande, oval arredondado a elíptico, de casca dura. Miolo médio a grande, elíptico alargado, castanho claro. Produção média, rendimento em miolo baixo.



Chatinhas

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio (g) –	4.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5/7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3/5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.0
	Rendimento em miolo % –	22.7

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, fraca densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto pequeno a médio, oval arredondado a elíptico, de casca dura a semi dura. Miolo pequeno a médio, elíptico alargado, castanho claro a castanho escuro. Produção baixa, rendimento em miolo médio.



Bonita do Calço

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	3
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Peso médio (g) –	4.8
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	24.2

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte erecto, aberto, forte densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Fruto médio, elíptico, de casca dura. Miolo médio, elíptico, castanho claro. Produção baixa, rendimento em miolo médio.



Galamba Grado

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3/5
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.8
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	26.5

Apreciação geral: Variedade de vigor médio, porte aberto, caído, fraca densidade foliar, com floração semi precoce de cor branco rosada. Fruto médio a grande, oval arredondado a elíptico, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produção baixa, rendimento em miolo médio.



Chorão

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	4.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.1
	Rendimento em miolo % –	23.4

Apreciação geral: Variedade de vigor médio, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração precoce a semi precoce de cor branco rosada. Fruto pequeno, elíptico, de casca dura. Miolo pequeno a médio, elíptico, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Barrinho Grado

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5/7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	6.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3.5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	22.7

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte erecto, aberto, média a forte densidade foliar, com floração semi precoce a tardia, branca a branco rosada. Fruto médio, pontiagudo, de casca rija. Miolo médio, elíptico, castanho claro a castanho escuro. Produção e rendimento em miolo médios.



Calhandrina

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.6
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	23.6

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, forte densidade foliar, com floração precoce branca a branco rosada. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Parida

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio (g) –	4.1
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.4
	Rendimento em miolo % –	33.3

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, fraca a média densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura a semi dura. Miolo médio, elíptico, castanho claro. Produção baixa, rendimento em miolo elevado.



Verdeal

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Peso médio (g) –	4.1
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.1
	Rendimento em miolo % –	27.4

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração precoce a semi precoce de cor branco rosada. Fruto pequeno a médio, oval arredondado a elíptico, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho escuro. Produtiva, rendimento em miolo médio.



Zé Dias

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	3.4
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5/7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.1
	Rendimento em miolo % –	30.9

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração precoce a semi precoce de cor branco rosada. Fruto pequeno, oval arredondado, de casca rija. Miolo pequeno a médio, elíptico a elíptico alargado, castanho claro. Produção média, rendimento em miolo elevado.



Cerro do Gato

Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Peso médio (g) –	6.4
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.4
Rendimento em miolo % –	22.7	

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, média a forte densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Fruto médio a grande, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio a grande, elíptico alargado, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Duro Italiano

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	4.5
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	23.9

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração precoce a semi precoce de cor branco rosada. Fruto médio, elíptico, de casca rija. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produção baixa, rendimento em miolo médio.



Amarelo Bonito

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Peso médio (g) –	7.6
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3/5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.6
	Rendimento em miolo % –	22.0

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração precoce branco rosada. Fruto grande, oval arredondado a elíptico, de casca dura. Miolo grande, elíptico, castanho claro a castanho escuro. Produção e rendimento em miolo baixos.



Patarata

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio (g) –	6.3
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.4
	Rendimento em miolo % –	23.5

Apreciação geral: Variedade de médi vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce o a forte de cor rosa escuro. Fruto médio a grande, oval arredondado a elíptico, de casca dura a semi dura. Miolo grande, elíptico alargado, castanho escuro. Produção e rendimento em miolo médios.



Viegas

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3/5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7	
	Peso médio do miolo (g) –	1.1
	Rendimento em miolo % –	21.1

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração precoce a semi precoce de cor branca. Fruto médio, elíptico, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produtiva, rendimento em miolo baixo.



Laja

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3/5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.1
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	26.5

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, fraca a média densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Fruto médio, elíptico, de casca dura. Miolo pequeno a médio, elíptico, castanho claro. Produtiva, rendimento em miolo médio.



Verniz

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
Fruto	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	4.7
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	26.1

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração precoce de cor branco rosada. Fruto pequeno a médio, oval arredondado a elíptico, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produtiva, rendimento em miolo médio.



Manuel de Oliveira

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.1
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3/5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.1
	Rendimento em miolo % –	21.6

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, média a forte densidade foliar, com floração semi precoce de cor branco rosada. Fruto médio, elíptico, de casca dura. Miolo médio, elíptico, castanho claro. Produtiva, rendimento em miolo baixo.



João Dias

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3/5
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3/5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
Fruto	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	6.3
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	20.0

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, caído, média densidade foliar, com floração semi precoce de cor branco rosada. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produção média, baixo rendimento em miolo.



Enxame

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.1
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.4
	Rendimento em miolo % –	23.7

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Do Convento

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5/7
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhotes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3
Fruto	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	4.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	3/5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.1
	Rendimento em miolo % –	23.8

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto pequeno a médio, elíptico, de casca dura. Miolo médio, estreito a elíptico, castanho escuro. Produção e rendimento em miolo médios.



Ferralise

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3/5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio (g) –	4.3
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	3
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	1/3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	25.8

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte erecto, aberto, média a forte densidade foliar, com floração tardia branco rosada. Fruto médio, elíptico a pontagudo, de casca dura a semi dura. Miolo médio a grande, estereito, amarelo a castanho claro. Produção baixa, rendimento em miolo médio.



Saya Longa

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	3
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3/5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Peso médio (g) –	4.8
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	3
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	1
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	28.1

Apreciação geral: Variedade de fraco vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração precoce a semi precoce branco rosada. Fruto médio, elíptico a pontagudo, de casca dura a semi dura. Miolo grande, esterito a elíptico, amarelo. Produção baixa, rendimento em miolo médio.



Romeira

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.9
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5.7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	25.3

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração precoce a semi precoce branco rosada. Fruto médio a grande, elíptico, de casca dura. Miolo médio a grande, elíptico, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Ribeton

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
Fruto	Peso médio (g) –	6.8
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5/7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3/5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.6
	Rendimento em miolo % –	23.1

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração precoce branca a branco rosada. Fruto médio, oval arredondado, de casca dura a semi dura. Miolo grande, elíptico a elíptico alargado, castanho claro a escuro. Produtiva, médio rendimento em miolo.



Glorieta

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio (g) –	6.3
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.8
	Rendimento em miolo % –	28.0

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, aberto, média a forte densidade foliar, com floração tardia, branca a branco rosada. Fruto grande, pontiagudo, de casca semi dura a frágil. Miolo grande, elíptico alargado, castanho claro. Produtiva, médio rendimento em miolo.

Jefferies

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétala – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio (g) –	
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio do miolo (g) –	
	Rendimento em miolo % –	

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Sem produção, fruto por caracterizar.



Marcelina Grada

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	1
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	7.9
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	2.1
	Rendimento em miolo % –	28.2

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto grande, oval arredondado, de casca dura. Miolo grande, elíptico alargado, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.



Carmel

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Fruto	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	14.5
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3/5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Peso médio do miolo (g) –	2.5	
	Rendimento em miolo % –	12.5

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte erecto, média densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Fruto muito grande, elíptico, de casca dura. Miolo grande, elíptico alargado, castanho claro a escuro. Produção e rendimento em miolo baixos.



Masbovera

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5/7
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio (g) –	5.5
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	3/5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.6
	Rendimento em miolo % –	27.0

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, aberto, média a forte densidade foliar, com floração tardia de cor branca. Fruto grande, pontiagudo, de casca semi dura a dura. Miolo grande, esterito a elíptico, castanho claro. Produtiva, médio rendimento em miolo.



Pegarinhos

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7
	Peso médio (g) –
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7
	Peso médio do miolo (g) –
	Rendimento em miolo % –

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração precoce a semi precoce de cor branco rosada. Fruto médio, elíptico, de casca rija. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro. Produção baixa, rendimento em miolo média.



Francoli

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio (g) –	5.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio do miolo (g) –	1.4
	Rendimento em miolo % –	26.4

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, aberto, média a forte densidade foliar, com floração tardia de cor branca. Fruto médio, pontagudo, de casca dura a semi dura. Miolo grande, elíptico, castanho claro. Elevada produção, médio rendimento em miolo.



Laurane

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaduda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Peso médio (g) –	4.7
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.4
	Rendimento em miolo % –	29.7

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração tardia de cor branca. Fruto grande, pontiadudo, de casca dura a semi dura. Miolo grande, elíptico alargado, castanho claro. Produtiva, bom rendimento em miolo.



Dona Virtude

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3/5
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio (g) –	3.9
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	3
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	1/3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	30.2

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, caído, forte densidade foliar, com floração precoce a semi precoce branco rosada. Fruto médio, pontiagudo, de casca dura a semi dura. Miolo pequeno, esterito, amarelo a castanho claro. Produção baixa, rendimento em miolo elevado.



Mourisca

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3/5
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhotes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio (g) –	5.6
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5/7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5	
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	24.5

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, caído, fraca densidade foliar, com floração semi precoce rosa escuro. Fruto médio, oval arredondado, de casca semi dura a dura. Miolo médio, elíptico a alargado, castanho claro. Produção e rendimento em miolo médios.

Padre

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio (g) –	
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio do miolo (g) –	
	Rendimento em miolo % –	

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, média densidade foliar, com floração tardia de cor branca. Sem produção, fruto por caracterizar.



Casa Nova

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhotes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Peso médio (g) –	6.5
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	7
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.4
	Rendimento em miolo % –	21.5

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte erecto, média densidade foliar, com floração semi precoce branco rosada. Fruto médio a grande, elíptico, de casca dura. Miolo grande, elíptico alargado, castanho escuro. Produção e rendimento em miolo baixos.



Fura Sacos

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5/7
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3/5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio (g) –	5.1
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	27.3

Apreciação geral: Variedade de médio a forte vigor, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Fruto médio, elíptico a pontagudo, de casca semi dura a dura. Miolo médio a grande, elíptico, castanho escuro. Produção e rendimento em miolo médios.

Price

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5/7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Cor da pétala – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio (g) –	
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	
	Peso médio do miolo (g) –	
	Rendimento em miolo % –	

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração semi precoce a tardia de cor branca. Sem produção, fruto por caracterizar.



Monterrei

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	15.1
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	3.3
	Rendimento em miolo % –	19.5

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte erecto, média densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Fruto muito grande, elíptico, de casca dura. Miolo grande, elíptico, castanho escuro. Produção e rendimento em miolo baixos.



Colossal

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Flor	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5/7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	12.8
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Fruto	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3/5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	2.1
	Rendimento em miolo % –	16.4

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte erecto, média densidade foliar, com floração semi precoce a tardia de cor branca. Fruto muito grande, elíptico, de casca dura. Miolo grande, elíptico alargado castanho claro a escuro. Produção e rendimento em miolo baixos.



José Dias

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1/3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio (g) –	6.5
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.6
	Rendimento em miolo % –	22.7

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração semi precoce branca a branco rosada. Fruto médio, oval arredondado a elíptico, de casca dura. Miolo médio a grande, elíptico alargado, castanho escuro. Produtiva, rendimento em miolo médio.



Duro da Estrada

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5/7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhete de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3/5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	1
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.6
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	1/3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	23.9

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração precoce a semi precoce branca a branco rosada. Fruto pequeno a médio, oval arredondado, de casca dura. Miolo médio, elíptico alargado, castanho claro a castanho escuro. Produtiva, rendimento em miolo médio.



Gama

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	7
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhotes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5/7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3/5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	8.9
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5/7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3/5
	Peso médio do miolo (g) –	1.6
	Rendimento em miolo % –	16.9

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte erecto, aberto, média a forte densidade foliar, com floração semi precoce a tardia rosa escuro. Fruto grande, elíptico a pontagudo, de casca dura. Miolo grande, elíptico alargado, castanho claro. Produção média, rendimento em miolo baixo.



Bonita

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5/7
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhotes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaguda 5	3
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Fruto	Peso médio (g) –	5.1
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.2
	Rendimento em miolo % –	21.5

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Fruto médio, elíptico, de casca dura. Miolo médio, elíptico, castanho claro. Produção média, rendimento em miolo baixo.



Desmayo

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	3/5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	3
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	7
	Peso médio (g) –	5.7
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Peso médio do miolo (g) –	1.6
	Rendimento em miolo % –	24.0

Apreciação geral: Variedade de médio vigor, porte aberto, forte densidade foliar, com floração precoce a semi precoce branco rosada. Fruto médio, pontiagudo, de casca dura. Miolo grande, esterito a elíptico, castanho claro. Produção baixa a média, rendimento em miolo médio.



Ferragnês

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Flor	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	5
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5/7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaguda 5	3/5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio (g) –	5.2
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	5
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3	
Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5	
Peso médio do miolo (g) –	1.8	
Rendimento em miolo % –	24.3	

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, aberto, média a forte densidade foliar, com floração semi precoce a tardia de cor branca. Fruto médio a grande, elíptico a pontiagudo, de casca tenra a semi dura. Miolo médio a grande, elíptico, castanho claro. Produção média a elevada, rendimento em miolo médio.



Ferraduel

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5/7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	3/5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio (g) –	6.7
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	3
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.7
	Rendimento em miolo % –	24.3

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, erecto, média a forte densidade foliar, com floração semi precoce a tardia branco rosada. Fruto grande, elíptico a pontagudo, de casca semi dura. Miolo grande, elíptico estreito, castanho claro. Produtiva, rendimento em miolo médio.



Ferrastar

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
Folha	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
Flor	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontiaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
Fruto	Peso médio (g) –	4.9
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	5
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
	Peso médio do miolo (g) –	1.5
	Rendimento em miolo % –	28.0

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte erecto, aberto, média densidade foliar, com floração tardia de cor branca. Fruto médio, pontiagudo, de casca semi dura. Miolo grande, elíptico alargado castanho escuro. Produção baixa, rendimento em miolo médio.



Cristo Morto

	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
Árvore	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Caído 5	1/3
	Rebentação foliar – Anterior à floração 3 Simultânea 5 Posterior 7	5
	Densidade foliar – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5/7
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor – Verde claro 3 Verde 5 Verde escuro 3	7
	Distribuição – Esporões/Ramalhetes de Maio 1 Verdascas 2 Ramos mistos 3	1/2/3
Flor	Época de floração – Precoce 3 Semi precoce 5 Tardia 7	5/7
	Tamanho da flor – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Cor da pétalas – Branca 1 Branco rosada 3 Rosa escuro 5	1/3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Oval / arredondada 1 Elíptica 3 Pontaguda 5	5
	Resistência ao partir – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio (g) –	4.6
	% de miolos duplos – Fraca 3 Média 5 Forte 7	3
Fruto	Forma do miolo – Elíptica/estreita 3 Elíptica 5 Elíptica / alargada 7	7
	Tamanho do miolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Cor do miolo – Amarelada 1 Castanho claro 3 Castanho escuro 5	3
	Rugosidade do miolo – Fraca 3 Média 5 Forte 7	5
	Peso médio do miolo (g) –	1.3
	Rendimento em miolo % –	26.7

Apreciação geral: Variedade de forte vigor, porte aberto, erecto, média a forte densidade foliar, com floração semi precoce de cor branca. Fruto médio a grande, pontagudo, de casca semi dura. Miolo grande, elíptico alargado, castanho claro. Produção elevada, rendimento em miolo médio.

Variedade	Origem	Época de floração											
		Janeiro				Fevereiro				Março			
		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
Fofana (*)	Parragil Algarve												
Manuel de Oliveira	Paderne Algarve												
João Dias	Cotovio Algarve												
Ferrastar (*)	Ceat França												
Enxame	Balurcos Algarve												
Do Convento	Mexilhoeira Grande Algarve												
Ferralise	Ceat França												
Saya Longa	Qta. de Valongo T. Montes												
Romeira	Qta. de Valongo T. Montes												
Ribeton	Qta. de Valongo T. Montes												
Glorieta	Qta. de Valongo Espanha												
Jefferies	Qta. de Valongo USA												
Marcelina Grada	Qta. de Valongo T. Montes												
Carmel	Qta. de Valongo USA												
Parada (*)	Qta. de Valongo T. Montes												
Masbovera	Qta. de Valongo Espanha												
Pegarinhos	Qta. de Valongo T. Montes												
Francoli	Qta. de Valongo Itália												
Lauranne	Qta. de Valongo França												
Dona Virtude	Qta. de Valongo T. Montes												
Mourisca	Qta. de Valongo T. Montes												
Padre	Qta. de Valongo USA												
Casa Nova	Qta. de Valongo T. Montes												
Fura Sacos	Qta. de Valongo T. Montes												
Price	Qta. de Valongo USA												
Monterrey	Qta. de Valongo USA												
Colossal	Qta. de Valongo T. Montes												
Duro Italiano	Qta. de Valongo T. Montes												
José Dias	Qta. de Valongo T. Montes												
Soleta	Espanha												
Belona	Espanha												
Duro da Estrada	Qta. de Valongo T. Montes												
Gama	Qta. de Valongo T. Montes												
Bonita	Qta. de Valongo T. Montes												
Bonita de S. Brás	Qta. de Valongo T. Montes												
Desmayo	Qta. de Valongo Espanha												
Texas (*)	Qta. de Valongo T. Montes												
Marcona (*)	Qta. de Valongo T. Montes												
Ferragnês	Qta. de Valongo França												
Ferraduel	Qta. de Valongo França												
Ferrastar	Qta. de Valongo França												
Cristo Morto	Qta. de Valongo Itália												

(*) - Variedade perdida devido a ataques de agrobacterium

João Manuel Guerreiro Costa (1952), natural de Querença, Loulé, Residente em Faro, licenciado em Ciências Agronómicas pelo Instituto Superior de Agronomia (1976).

Técnico da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve desde 4 de setembro de 1976 com desempenho em funções técnicas e de chefia nas áreas de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Participação ao longo de mais de 40 anos em ações e projetos de experimentação nas áreas da horticultura, floricultura, jardinagem, espaços verdes, fruticultura subtropical e mediterrânica, vinha e divulgação de resultados quer através de diversos órgãos de comunicação social, quer através de um enorme legado de informação escrita.

Armindo J. G. Rosa (1953), é natural de Castro Marim, residente em Faro, formado na Escola de Regentes Agrícolas de Évora (1978). No Ministério da Agricultura desde 1981, é Técnico Superior na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve onde tem exercido funções técnicas e de coordenação com especial relevância nos na área da experimentação (fertirrega e culturas hidropónicas):

1981/1987 – Técnico do projecto Luso Alemão de Hortofruticultura;

1987/2010 – Técnico com responsabilidades na área da experimentação (hortofruticultura, floricultura, rega, solarização de solos, controlo climático de estufas, hidroponia, compostagem);

1990/2003 – Gestor do Centro de Experimentação Hortofruticola do Patacão;

1993/1997 – Chefe de Divisão de Desenvolvimento e Gestão da produção;

2009/2010 – Gestor de Núcleo no âmbito do Recenseamento Agrícola 2009 (RA09);

2010/ 2017 – Colaboração nos projectos Sulcastas 18.999 (vinha) e Frutal 18.642 (fruteiras regionais).

2017/2019 – Apoio técnico especializado e emissão de pareceres técnicos na área da Hortofruticola.

Fotografia: Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve



REPÚBLICA
PORTUGUESA

AGRICULTURA
MAR



DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – D.C.D.